

**XI. Observatio Defectus Lunæ habitæ (tubo optico  
optima notæ, longo pedes Parisienses septem) Pa-  
tavii VI. Id. Octob. 1726. ab eodem Viro Cla-  
rissimo.**

*Temp. Appar.*

H. 1 11

- 16 16 44 Penumbra diluta.  
 18 54 Penumbra densior.  
 21 19 Umbra ad Lunæ limbum.  
 31 35 Attingit Mare Humororum.  
 35 47 Attingit Grimaldum.  
 38 34 Distat a Tychone diametro Tychonis  
 ipsius, & Grimaldum tegit tertia ejus-  
 dem Grimaldi parte.  
 50 40 Fere attingit Pitatum.  
 17 3 41 Lansbergium tegit.  
 7 45 Attingit Reinoldum.  
 15 56 Attingit Fracastorium, & Galileum.  
 25 53 Attingit Mare Fœcunditatis.  
 39 6 Umbra proxima est ad Reinoldum, te-  
 gitque partem tertiam Maris Fœcunditatis.  
 46 Grimaldus emergit.  
 54 53 Grimaldus jam distabat ab umbra dia-  
 metro majore sui integra.  
 18 5 44 Gassendus totus modo extra umbram,  
 Mare Fœcunditatis dimidia circiter  
 parte detectum, inter dehiscentes nubes  
 videbantur.  
 Quæ nubes ad Finitorem deinde coactæ  
 occiduam Cæli partem penitus obumbra-  
 vere; neque Luna posterus apparuit.